

# 男子做膝蓋手術後猝死

## 疑出現靜脈栓塞 家屬指院方疏忽

【記者梁洵瑜報道】一名任職保安的中年男子，工作時跌傷進入東區醫院治療，接受膝蓋手術後轉到東華東院進行復康治療，但昨日突然暈倒，搶救無效死亡，其家屬懷疑院方疏忽，未發現病人在手術後出現靜脈栓塞，血塊流入心肺，導致突然喪命，遺下一名不足四歲的女兒及妻子。

死者姊姊蘇小姐昨日稱，四十八歲的弟弟，幼時患小兒麻痺症導致走路一拐一拐，任職保安員，在上月中工作時跌倒受傷，送往東區醫院急症室，但醫生當時指他沒有斷骨，毋須留院，但當時他「行都行唔到」，在家人多番堅持下才讓他留院觀察，翌日院方卻稱病人要進行骨科手術。

病人上周六轉到東華東院接受復康治療，但仍未能自行郁動，到洗手間也要坐輪椅，昨早其妻帶備湯水前往探望，豈料病人卻在洗手間內暈倒，經搶救後，在九時五十五分不治。

蘇小姐指出，搶救期間有醫生向家人說，

懷疑死者腳部的血塊流到心臟及肺部，「血塊塞住心肺」死亡。她批評，既然「醫生話任何一個做呢啲手術嘅病人都有機會咁樣」，故質疑為何事先沒有向病人說明，也沒有做好預防措施，「如果個個都有機會，點解唔早啲預防。」

她又稱，弟弟生前只靠月薪五千元供養家庭，女兒還不足四歲，妻子及七十高齡的母親仍無法接受死訊。她強調，死者生前患有糖尿病及血壓高，也較為肥胖，手術後腿部很腫，但醫護稱手術後會有這種情況。

### 院方：致深切慰問

骨科醫生高拔萃說，接受下肢關節置換手術病人，約三成會出現靜脈栓塞，骨折手術則較少出現這種情況。一般而言，接受下肢關節置換手術的病人，若預計需要長時間臥床而無法郁動、或手術前已有一段時間沒有活動、肥胖、年齡較高等人士，都是血栓塞高危者，手術前後要食薄血丸，但毋須每名病人也處方。

東華東院稱，昨早八時病人暈倒後馬上送回病床急救，病人稍後甦醒，繼續給予治療，但病人情況突轉差，搶救無效，個案已交死裁判官跟進，院方對病人離世及其家人致深切慰問，但未有回應死者是否出現靜脈栓塞。

### 蘇先生接受治療及離世事件簿

4月15日	工作時跌倒受傷，送進東區醫院急症室，初時醫生表示無骨折，毋須留院，但在家屬要求下接受觀察
4月16日	醫生表示要做骨科手術
4月21日	在東區醫院接受骨科手術
4月30日	轉送東華東院接受復康治療
昨日早上八時	在洗手間暈倒，搶救後不治，個案交死裁判官跟進

資料來源：死者蘇先生家屬及東華東院

6-5-2005 蘋果日報

美國HealthGrades Patient Safety於27-7-2004指出，美國於2000~2002年期間，平均每年有約195,000人死於醫療事故。哈佛大學教授Lucian Leape經研究後指出，美國每年因醫源性疾病而受害的約有一百萬人，因此而死亡的更達120,000人，比全美一年死於被手槍打死的二萬多人多五倍、車禍死的四萬人多近三倍！