

阿士匹靈滿其他藥或致不適

【本報訊】澳洲皇家墨爾本醫院的一項研究指出，阿士匹靈 (Aspirin) 與其他藥物混合服用時，會對身體產生不良後果。這是由於阿士匹靈並非醫生處方藥物，另一方面醫生也經常建議心臟病患用此藥，同時表示該藥有預防中風的效用。

根據一項由去年十一月至今年三月的研究顯示，約有百分之一留院的病人是因將阿士匹靈與其他藥物混合服用後致身體不適所致。


是項研究指出，四百零九名到皇家墨爾本醫院急症室求診的病人，在同時服用兩種或以上藥物後，證實可能會導致身體產生八百五十五種副作

用，其中有二百三十七種是與阿士匹靈有關。

存在致命危險

該院的緊急藥物研究部主席 David Taylor 副教授表示，在這批病人當中，有六成二是與同時服用多種藥物後引致身體不適有關，其中有百分之十三點五屬於嚴重程度，即存在致命危險；另有百分之七十一屬中等程度，以及百分之十三點五屬於輕微。

他又稱，病人在同一時間服用的藥物愈多，對身體產生副作用的風險也愈大。



■ 醫生常建議心臟病患者服用阿士匹靈，並表示該藥有預防中風的效用。

蘋果日報 2005年11月25日

澳洲皇家墨爾本醫院的研究指出，同時服用兩種或以上的藥物後，可能導致身體產生855種的副作用，其中有237是與阿士匹靈有關。

九九年The Annual of Pharmacotherapy報道：30%於急症中的診症者都是與藥物副反應有關的。因藥物不良反應而需入院治療的病人總數，佔美國全年住院病人的17%，同樣的情況在英國佔25%，在加拿大則高達30%以上。