



■梁憲孫指淋巴癌病人化療前應先檢驗是否患上乙型肝炎

健康教育系列

【本報記者梁家強報道】淋巴癌近年的發病率及死亡率不斷上升，香港大學的研究發現，淋巴癌病患上乙型肝炎的機會是普通人的兩倍，而治療淋巴癌的化療藥物，會導致五成同時患上肝炎的病人出現肝炎急性惡化，當中半成更會因此死亡，因此建議所有淋巴癌病人接受化療前，應首先檢驗是否乙型肝炎帶菌者，如發現有肝炎便需首先服食治肝炎藥物，以避免併發肝炎而死亡。

淋巴癌半年可奪命

淋巴癌是本港最常見的第十種癌症，近十年的病患者上升逾兩成，每年新增個案達六百宗，而死亡人數則大幅增加八成，零一年便有一百一十二人死於此症。早期的淋巴癌治癒率高達八至九成，但淋巴癌亦可在半年內導致病人死亡。

根據數據顯示，本港的淋巴癌病人中，有兩成人同時是乙型肝炎帶菌者，較一般人口的一成高出一倍，香港大學內科學系血液及腫瘤科講座教授梁憲孫解釋，可能是由於淋巴癌會抑制免疫系統，導致本身曾接觸病毒而自行產生抗體者的抵抗力減弱，病人遂變成乙型肝炎的帶菌者。

化療藥減弱免疫力

梁憲孫又指，由於治療淋巴癌的化療藥物，會令病人的免疫能力減弱，令肝炎病毒在體內迅速繁殖，因而導致五成肝炎病人出現肝炎急性惡化，當中百分之五更會因此死亡。香港大學兩年前在伊利沙伯醫院進行研究，發現如果讓肝炎病人在接受化療前，首先服用肝炎藥拉米夫定，可完全避免化療併發肝炎惡化的問題。

梁憲孫建議所有淋巴癌的病人，在接受化療前應首先檢驗是否乙肝帶菌者，如有肝炎便應服用拉米夫定，在化療完成後亦應繼續服用最少三個月。

另外，梁憲孫亦提到，中國人在鼻腔出現淋巴癌的機會較西方國家高，以香港為例每年約有二十宗個案，而鼻腔淋巴癌的治癒率較其他部位低一半，只有四至五成；而一般鼻腔淋巴癌的病徵較難察覺，病者會有鼻塞及流鼻血的情況，由於病徵普遍，不少人都會忽略，梁憲孫呼籲長期有鼻塞及經常流鼻血的人士，應找耳鼻喉專科醫生作詳細檢查。

淋巴癌是全港最常見的第十種癌症，近年的發病率及死亡率不斷上升，而用來治療淋巴癌的化療藥會減弱人體的免疫能力，導致五成同時患上肝炎的病人出現肝炎急性惡化，當中一半更會因此死亡，治療中心顧問表示只有約10%的抗癌藥物真正有效。Dr. John Cairns在《美國科學》雜誌上更說：「化療只有約2%~3%的果效」。

8-11-2004
新報

治淋巴癌化療藥令肝炎惡化